

PREPARACIÓN PARA POLIPECTOMÍA DE COLON BAJO SEDACION

Tome unos minutos para leer detenidamente y entender el procedimiento el cual se va a realizar en Gastro Center. Esta información es relevante y esta descrita en forma sencilla.

¿Qué es una Polipectomía de Colon?

La polipectomía de colon es un procedimiento terapéutico ambulatorio que permite la extracción de pólipos (crecimientos anormales del tejido) mientras se realiza una colonoscopia, mediante unas pinzas especiales las cuales permiten el corte y disección del tejido anormal.

- Una semana antes de la polipectomía debe suspender la toma de preparados de hierro, ácido acetilsalicílico (Aspirina®) y otros antiagregantes (medicamentos utilizados para prevenir la trombosis) como Iscover® o Plavix®, salvo que su médico le indique lo contrario.
- Si está tomando anticoagulantes como Cumadin o Warfarina, puede ser necesario suspenderlos de 3 a 5 días antes de la colonoscopia y sustituirlos por otro tipo de anticoagulante inyectado, por lo cual debe ponerse en contacto a tiempo con su médico tratante o hematólogo.
- Si tiene alguna duda de los medicamentos que toma por favor comunicarse a Gastro Center.

¿CÓMO CONSEGUIR UNA ADECUADA PREPARACIÓN PARA LA POLIPECTOMIA DE COLON?

1. El día anterior a su colonoscopia comience con una dieta baja en residuos (La dieta baja en residuos está diseñada para proporcionar alimentos que dejen una cantidad mínima de materiales sin digerir en el tubo digestivo. Una dieta baja en residuos y baja en fibras restringe alimentos tales como los granos integrales, la mayoría de las frutas y vegetales, las legumbres, las nueces y las semillas).
 - ✓ **Permitidos:** leche y yogur natural desnatados, mantequilla en poca cantidad, quesos frescos y quesos duros; pan blanco o tostado y galletas no integrales; caldos sin verduras, arroz y pastas no integrales; carnes y pescados blancos a la plancha o cocidos, patatas en puré o cocidas, sin la piel; café, té e infusiones ligeras.
 - × **Prohibidos:** productos lácteos enteros, quesos grasos, productos integrales, frutas, verduras y legumbres, carnes grasas, embutidos, chocolate, pasteles y frutos secos. Si es diabético escogerá entre los alimentos anteriores los que se ajusten a su dieta para la diabetes.
2. El día anterior a la colonoscopia deje de tomar alimentos sólidos al menos unas 3 ó 4 horas antes de iniciar la limpieza intestinal.
3. A partir de ese momento sólo podrá tomar "líquidos claros": agua, infusiones, caldos filtrados, café o té, zumos de fruta colados y bebidas refrescantes claras. Si toma pastillas para la diabetes, suspéndase a partir de la última comida sólida

previa a la limpieza intestinal, hasta después de realizada la colonoscopia. Si está a tratamiento con insulina es preferible que le realicen la exploración a primera hora de la mañana o de la tarde y puede ser necesario, debido a las modificaciones en la dieta, reducir las dosis de insulina previas a la colonoscopia (consulte con su médico).

4. Como método de limpieza intestinal sugiero productos con polietilenglicol que tienen menos efectos colaterales. Tome suficiente agua para no dejarse deshidratar. Solución evacuante con polietilenglicol (Marca comercial: Evacuante **Klean Prep®**)
 - Prepare la solución mezclando el contenido de los sobres (4) con agua (cada sobre en un litro), según las Indicaciones del fabricante.
 - Inicie la preparación 12 horas antes de su cita de colonoscopia y tome de 200 a 250 cc (un vaso) de dicha solución cada 15 minutos hasta completar dos litros en dos horas aproximadamente.
 - Cinco horas antes de su cita de colonoscopia tome de 200 a 250 cc (un vaso) de dicha solución cada 15 minutos hasta completar los dos litros restantes en dos horas aproximadamente.
 - Asista a su cita de colonoscopia con un adulto responsable, en ropa liviana, sin joyas, si tiene esmalte en las uñas por favor retirarlo. No olvide traer documento de identidad, la respectiva autorización de su medicina prepagada y exámenes previos relevantes a su colonoscopia (tac de abdomen, ecografía abdominal, colonoscopia o endoscopia anterior).
 - Si se va a realizar su procedimiento bajo sedación debe tomar una hora después del procedimiento para darle de alta.

INSTRUCCIONES POST PROCEDIMIENTO DE POLIPECTOMIA DE COLON

- Es esencial que alguien lo acompañe de regreso a casa, si ha recibido sedación, usted no puede conducir vehículos, operar maquinaria, ni tomar bebidas alcohólicas durante las próximas 24 horas. Si el procedimiento se realizó sin sedación usted puede reanudar sus actividades cuando se sienta en condiciones de hacerlo.
- Usted puede reiniciar su dieta blanda a menos que su médico le de otra recomendación.
- Usted puede reiniciar sus medicinas prescritas
- Puede sentir ligera molestia donde el colonoscopio fue colocado pero esta debe desaparecer al día siguiente.
- Puede experimentar sensación de distensión por el aire que permanece en su tracto gastrointestinal, este debe resolverse en cuestión de horas.
- Por favor diríjase al servicio de urgencias SI:
 - Presenta vómito o dolor severo
 - Sangrado rectal o vómito con sangre
 - Presenta fiebre (Tem >de 38 oC)
 - Enrojecimiento, dolor o inflamación en el sitio de la vena punción que persiste por más de 48 horas.
- Si le han tomado biopsias, los resultados tomarán algunos días, recuerde
- Solicitar su cita de control con el médico que le ordenó el procedimiento.